



SMILELINE CLINIC, S.L.
CLÍNICA ESPECIALIZADA EN ORTODONCIA

DRA. MARTA SERRA SERRAT
PL. ADRIÀ, 6 08021 BARCELONA TEL. 93 200 20 92
www.orto.org smileline@orto.org

RETENCIÓN

La estabilidad del resultado es tan importante como todo el tratamiento. Debemos colocar siempre retenedores linguales fijos.

Los retenedores son los aparatos que se utilizan en la fase de retención (fase posterior al tratamiento de ortodoncia).

Estos aparatos tienen como misión la de dar estabilidad a los resultados obtenidos en la fase activa del tratamiento de ortodoncia. Los dientes y tejidos todavía no se han ajustado completamente a su nueva posición y son necesarios estos aparatos para mantener los dientes en su nueva posición, permitiendo que se asienten los tejidos de soporte



Tan importante es esta fase que consideramos que si el paciente no va a colaborar en llevar estos aparatos así como en su mantenimiento, recomendamos que no se realice ningún tratamiento de ortodoncia, ya que el riesgo de que los dientes puedan sufrir movimientos indeseados (recidivas o movimientos derivados de la presión de las muelas del juicio) es muy alto. Por tanto es fundamental que la fase de retención sea considerada una continuación del tratamiento de ortodoncia.

¿CUÁNDO Y COMO SE PONE LA RETENCIÓN?

La retención se cementa en la cita de sacar aparatos, nuestra especialista la hace a la medida exacta de la posición correcta de los dientes y sin ningún tipo de molestia ni dificultad la cementa. No da ningún tipo de alergia.

¿CUÁNDO SE TIENE QUE REVISAR LA RETENCIÓN?

La retención se tiene que revisar periódicamente según le comente la Dra. Serra-Serrat en las visitas. Si antes de la visita de control se nota alguna molestia con la retención no se tienen que esperar a la visita, es mejor acudir a la especialista lo antes posible